

Strmělka pohárovitá

databáze hub

Zasláno od: Dakob

Datum zveřejnění: 10.5.2005



Český název: Strmělka pohárovitá

Latinský název: *Clitocybe formosa*

Výskyt: Houba roste v říjnu a listopadu v listnatých lesích v opadalém listí a je jedovatá.

Popis: Klobouk je kolem 4 cm široký, plochý, miskovitě prohloubený, později až pohárovitý, zavlhka šedohnědý až umbrově hnědý, hygrofánní, zasucha a v stáří špinavě šedý s nahnědlým středem, s okrajem v mládí podvinutým, pak jen mírně sklopeným a zvlněným. Lupeny jsou nízké, sbíhavé, některé vidličnatě rozvětvené, šedé. Třeň je 3-4 cm vysoký a 3-4 mm tlustý, válcovitý, zploštělý, tenké dutý, tuhý, chrupavčitý, šedohnědý, tmavší než klobouk, dole obrostlý bílými vlákny podhoubí, srůstajícími s listím. Dužnina je naředlá, má velmi hořkou chuť a nepříjemný plísňovitý až hnilobný pach. Výtrusy jsou bezbarvé, oválné, 5-7 x 3-4 mm velké.

Zaměnitelná je se strmělkou tmavonohou - *Clitocybe fuligineipes*, která má jen mírně nahořklou chuť a nepříjemný zemitý pach. Klobouk je zbarvený olivově hnědě až olivově šedě, jen zasucha je světle šedý, lupeny jsou světle žlutavé, třeň je velmi tmavě olivově šedý, ke spodině až skoro černý, rýhovaný, 3-7 cm vysoký a 4-8 mm tlustý. Výtrusy jsou oválné, 7-8 x 3 až 4 mm velké. Houba roste v listnatých i jehličnatých lesích a je rovněž jedovatá.

Období růstu:

jedlá - nejedlá - jedovatá

X. - XI.

