

Dřevo ambroně poskytuje poměrně výraznou vůni pryskyřice, která se občas používala k výrobě žvýkaček.

Latinský název: Liquidambar styraciflua

Čeleď: Vilínovité

Doba květu: Květen

Znaky: Opadavý strom vysoký až 25 m. Koruna je nejdříve úzká a kuželovitá později o mnoho širší a klenutá.



Kmen: obvykle není příliš vysoký, ale již nízko nad zemí rozvětvený.



Listy: střídavé, připomínají list javoru, na mladších stromech 3laločné, u starších 5-7 laločné, dlouhé asi 10-15 cm a podobně široké.



Květ: samčí bývá v zelenavých květenstvích. Samičí květy bývají v kulovitých hlávkách žlutavého zabarvení.



Plod: kulovitá, asi 3 cm velká; po dobu zimy zůstávají na stromě.



Větve: příkře vzpřímené, často stočené nebo zakřivené, menší větve odstávající nebo převislé.

Borka: mladých stromů bývá hladká a šedavá, ale u starších stromů rozpraskaná v malá, hranatá políčka a nakonec poměrně drsná a hustě sítnatě brázditá. Letorosty zelenavé nebo hnědé, zpočátku chlupaté.

Rozšíření: Ambroň západní pochází původem z východních a jihovýchodních Spojených států amerických. Ve střední Evropě bývá také často vysazován v parcích a botanických sbírkách.