

Borovice bělokorá

databáze stromů

Zasláno od: onys

Datum zveřejnění: 24.10.2005

Při povrchním určování by bylo možné tento strom zaměnit s podobně vypadající borovicí černou, jejichž jednotlivé oblasti rozšíření se překrývají.

Latinský název: Pinus leucodermis

Čeleď: Borovicovité

Doba květu: Květen až červen

Znaky: Vždy zelený jehličnan, vysoký asi 20 m, zřídka bývá vyšší, často však podstatně nižší.



Kmen: je velmi tlustý, směrem vzhůru se velmi pravidelně zúžuje



Listy: jsou jehlice dlouhé asi 7-9 cm. Málo ohebné a přímé





Květ: samičí šištice jsou vejcovité. Štítky na malých šupinách vyklenuté a s trnovým výběžkem



Plod: samčí šištice jsou četné v dolní části letorostů.

Větve: příkře vzpřímené, často stočené nebo zakřivené, menší větve odstávající nebo převislé.

Borka: zprvu hladká a zelenavě šedá, později světle šedá a rozdělená do jednotlivých políček, které mají obdélníkový tvar. Letorosty bývají zpočátku mírně ojiněné a modrozelené.

Rozšíření: V pohorských oblastech balkánu s lesními porosty. Místy lesnicky vysazována. Daří se jí na kyselých půdách.