

Český název: Klihatka černá

Latinský název: *Bulgaria inquinans*

Výskyt: Houba roste v létě a na podzim velmi hojně na poražených kmenech dubu, odkud vyrážejí plodničky jednotlivě nebo v řadách či skupinkách z trhlin kůry a svědčí o tom, že dřevo zustalo ležet příliš dlouho v lese a je ohroženo dalšími houbami, které je znehodnotí hnilobou. Dost často se houba objeví i na bukových kmenech, řidčeji i na jiných listnatých dřevinách, jako habrech, jilmech, břízách nebo kaštanovníku jedlém.



Popis: Plodničky jsou v mládí kulovité, pak kuželovité až miskovité, 1 - 4 cm veliké, v mládí zevně rezavohnědě plstnaté, pak leskle černé, tvrdě rosolovité, gumovité pružné, zasucha ztvrdlé. leskle černá ploška v horní části plodniček je plodná vrstva (thecium), obsahující válcovitě kyjovitá vřecka až 2 x 9 cm velká, jódem na vrcholku modrající. Vřecka obsahují často výtrusy dvojího typu. V horní části vřecek jsou čtyři výtrusy trochu ledvinitého tvaru velmi temně černohnědé, 11-14 x 6-7 cm velké, v dolní části jsou výtrusy podobného tvaru, ale bezbarvé, drobnější, obsahující po několika různě velkých olejových kapkách. Mezi vřečky jsou velmi tenké parafýzy, na koncích mírně zduřelé a zahnuté, zbarvené dohněda s olivově nazelenalým odstínem, 1 cm tlusté. Oba typy výtrusů jsou kličivé. Houba není jedlá.

Zaměnitelná zřejmě není.

Období růstu:



III. - X.

jedlá - nejedlá - jedovatá

