

Český název: Pestřec bradavčitý

Latinský název: Scleroderma verrucosum

Výskyt: Roste v humózních půdách listnatých lesů a parků, v létě a na podzim.

Popis: Plodnice 2-7 cm v průměru, kulovitá nebo na vrcholku stlačená, na spodu zúžená v delší, až 5 cm tlustou, na povrchu hluboce brázditou stopku ukončenou svazkem podhoubí. Peridie (okrovka) v mládí hladká, hnědá nebo načervenalé hnědá, později hnědožlutá s šupinkami nepravidelného tvaru, a s odstávajícím okrajem. Zralé plodnice mají okrovku tenkou a křehkou, vrchol plodnice bývá bez šupinek. Teřich (vnitřní obsah plodnice) zprvu tuhý, bílý, postupně růžově fialový až černý, složený z malých okrouhlých komůrek. V zralosti se mění v černý výtrusný prach (vlášení není vyvinuto). Čerstvá plodnice má na řezu zvláštní, silně kořenný pach.



Výtrusy 8-11 nm, kulovité, ostnité, tmavě hnědé. Přezky na hyfách peridie chybějí nebo jsou jen ojedinělé.

Je jedovatý stejně jako ostatní druhy. Upotřebit lze jen v malém množství jako koření mladé, dosud tuhé plodnice nakrájené na kolečka.

Zaměnitelná za pýchavku obecnou, která je jedlá a světlejší.

Období růstu:

jedlá - nejedlá - jedovatá



VI. - XI.