Latinský název: Cynictis penicillata Tany prvním objevitelům doslova zamotaly hlavu. Ačkoliv vzhledem připomínají trochu rejsky nebo veverky, jsou příbuzné opicím - primátům. Po určitou dobu byly proto řazeny do systematické blízkosti poloopic, nyní však již mají pro své odlišnosti vyčleněný vlastní řád.

savci	placentálové	tany	tanovití	tana severní
třída	nadřád	řád	čeleď	druh

• **Obývají tropické, vlhké pralesy, rádi se zdržují jak na zemi, tak na stromech.** Živí se různými tropickými plody, bezobratlými a drobnými obratlovci. Samice rodí po 45 - 55 denní březosti 1 - 4 holá mláďata. Ta ihned po porodu odkládá do předem připraveného hnízda z listí v dutině stromu. Rodiče se ukrývají v jiném hnízdě a samice přichází jen obden mláďata nakrmit.
• **Vysoce výživné mateřské mléko má zásluhu na rychlém vývoji potomků. Za 4 - 5 týdnů mláďata přiberou z 15 na 80 g.** Teprve v tomto stadiu se přestěhují do společného hnízda a nějakou dobu žijí s rodiči. Dospívají rychle, ve třech měsících jsou již velká jako rodiče a o měsíc později jsou plně dospělá a připravena se rozmnožovat.