

Latinský název: Bison bonasus je příbuzný amerického bizona. Rod bizonů je znám již z počátku čtvrtohor Evropy a Asie. Později pronikl i do Severní Ameriky, kde vytvořil mnoho ras amerických bizonů. Příslušníci eurasijských bizonů se rozrůznili na stepní a lesní formu zubra. Stepní zubr, kterého známe z jeskynních maleb člověka doby ledové, vyhynul se zánikem studených stepí a šířením lesů v poledové době.

savci	placentálové	sudokopytníci	turovití	zubr
třída	nadřád	řád	čeleď	druh



- **Zubr lesní byl jako lovná zvěř v Anglii vyhuben už ve dvanáctém století a ve Francii koncem čtrnáctého století.** V lesích střední a východní Evropy se zubr hojně vyskytoval ještě v osmnáctém století. U nás zubry připomínají místní jména jako Zubří a Zubrnice. Nyní žije v Bělověžském pralese a v dalších 25 rezervacích.
- **Zubr vymizel z přírody v souvislosti s rozsáhlým kácením lesů.** Podařilo se ho zachránit díky práci dr. Erny Mohrové, která zorganizovala chovnou skupinu. Je zařazen na listině ohrožených druhů IUCN a pražská zoo je zapojena do chovného programu EEP. Tělo má dlouhé 2,5 - 3,5 m, ocas 60 - 80 cm a výška v kohoutku činí 1,8 - 2 m. Váží 350 - 1350 kg. Samice je březí 260 - 270 dní a rodí 1 mládě.

