

Latinský název: *Lutra canadensis* Obývá jezera, řeky, bažiny a skalnaté mořské pobřeží Severní Ameriky od střední Kanady až po jih USA. Živí se rybami, obojživelníky a koryši. Její tělo je dlouhé 66 - 107 cm, ocas 30 - 40 cm a váží 8 - 12 kg.

savci	placentálové	šelmy	kunovití	vydra severoamerická
třída	nadřád	řád	čeleď	druh



- Na rozdíl od vydry říční zůstává vajíčko po oplození a počátečním rýhování v děloze samice až 8 měsíců v klidu než dojde k normálnímu vývoji. Tomuto jevu říkáme utajená březost, celková doba březosti je tak 10-12 měsíců; samička rodí 1-5 mláďat, která kojí 4 měsíce.
- Někteří lidé vydru považují za krásné zvíře a obdivují ji pro její **ladnost pohybů a hravé chování**. Na dokonalé funkci srsti závisí život vydry - proto její úpravě věnuje až 10% své aktivity. Od roku 1998 je znám celoroční výskyt vydry na Berounce mezi Černošicemi a Radotínem. V letech 1999 až 2001 se zde celoročně zdržoval minimálně jeden pár, v roce 2000 zde byla pozorována samice s odrostlými mláďaty (údaj pochází z pozorování místních rybářů).

